

Інформація для лікарів:

Рекомендовано почати емпіричну антибіотикотерапію, якщо:

1. Температура тіла перевищує 38° C
2. Підвищені лейкоцити (або позитивний результат тесту на лейкоцитарну естеразу)
3. Позитивний результат тесту на нітрити
4. Спастичність вища за початкову
5. Інші симптоми: протікання сечі поза катетером, автономна дисрефлексія, нездужання або озноб.

Або зачекайте результатів посіву.
Позитивний результат посіву - це 100 м / КФО. Не використовуйте нітрофурантоїн (Макробід), якщо є інші можливості, тому що він менш ефективний у лікуванні випадків ускладненої ІСВШ у пацієнтів із нейрогенним сечовим міхуром.

Referring Physician

X

Physician Stamp/Number



Spinal Cord Injury BC

ТРАВМА СПИННОГО МОЗКУ ТА НЕЙРОГЕННИЙ СЕЧОВИЙ МІХУР

Інформація про симптоми і лікування

Цю картку було розроблено Центром реабілітації Spinal Cord Injury BC та GF Strong у Ванкувері, Канада.
www.livingwithSCI.ca/wallet

Vancouver 
CoastalHealth

Connect: info@sci-bc.ca
More: www.livingwithsci.ca/bladder

Розповсюджені симптоми інфекції сечовивідних шляхів (ІСВШ)

Якщо у вас травма спинного мозку (ТСМ) і ви користуєтесь катетерами в менеджменті сечового міхура, ви повинні знати про підвищення ризику виникнення інфекції сечового міхура та нирок (відомі як інфекції ІСВШ).

Слід знати ознаки ІСВШ і що вони для вас означають!

- Підвищення температури вище 38°C/101°F
- Незвична спастичність
- Симптоми автономної дисрефлексії (якщо у вас ТСМ вище Т6):
пульсуючий головний біль,
потовиділення вище рівня травми, «гусяча шкіра» нижче рівня травми, відчуття сповільненого серцебиття.
- Озноб, незвична втомлюваність, відчуття нездужання
- Незвично неприємний запах сечі
- Незвичне протікання сечі або труднощі в підтриманні менеджмента сечового міхура

Якщо у вас озноб, біль у спині та один із вказаних симптомів, негайно зверніться до лікаря!

Як зібрати зразок сечі

НЕ БЕРІТЬ з катетера пацієнта.



ЗАВЖДИ беріть новий катетер.



Зовнішній дренаж
Зразок (напр., дренаж з кондому) слід брати із застосуванням «чистої» техніки за допомогою стерильного катетера або помочитися безпосередньо в контейнер, якщо ви можете це зробити.

Якщо ви застосовуєте «чисту» переміжну катетеризацію, обов'язково ретельно вимийте руки та геніталії і візьміть новий стерильний катетер для збору зразка сечі.

Постійні катетери
Якщо ви користуєтесь постійним катетером, катетером Фолея чи надлобковим катетером, і вам потрібно здати стерильний зразок сечі на посів, слід безпосередньо перед здачею сечі взяти новий стерильний катетер. Брати з катетера, що стояв у пацієнта до того, НЕ можна.

НЕ БЕРІТЬ з катетера пацієнта



ЗАВЖДИ застосовуйте техніку «чистого забору»

